



# POURQUOI FAUT-IL ARRÊTER DE FUMER AVANT UNE OPÉRATION ?

Parce que cela diminue  
les risques liés à l'**anesthésie**  
et à la **chirurgie...**

...et que cela sera toujours  
bénéfique pour votre opération  
et votre **convalescence**

**3 x moins**

de complications  
postopératoires

**3 x moins**

de risque  
de phlébites

**2 x moins**

de complications respiratoires  
et cardiovasculaires

**2 x moins**

d'infections et de problèmes  
de cicatrisation

**2 x moins**

de risque de ré-opération  
après une prothèse  
de hanche ou de genou

**5 x moins**

de retards de consolidation  
après fracture

**3 x moins**

de risque de non-consolidation  
après une arthrodèse  
(fusion osseuse)



**Dans certaines  
situations,  
continuer de fumer  
contre-indique  
la chirurgie,  
car les risques  
d'échec sont trop  
importants**

Arrêter de fumer

**2 mois avant**

**et**

**3 mois après**

l'intervention  
orthopédique  
réduit  
considérablement  
les risques  
liés au tabac

**50 %**

des patients  
qui arrêtent de fumer  
pour leur intervention  
réussissent à arrêter

**définitivement**

**PARLEZ-EN  
avec votre médecin  
ou consultez le site**

**[www.tabac-info-service.fr](http://www.tabac-info-service.fr)**

